

### **Esquema Vacinal para Difteria**

- Indivíduos com 2, 4 e 6 meses: **3** (três) doses da **vacina pentavalente** com intervalo de 60 dias entre as doses;
- Indivíduos com 15 meses e 4 anos previamente vacinados: **2** (duas) doses de reforço da **vacina DTP**;
- Indivíduos a partir de 7 anos de idade sem comprovação vacinal, adolescentes, adultos e idosos: **3** (três) doses da vacina **dT** com intervalo de 60 dias entre elas e **1** (uma) dose de reforço a cada **10** anos; ou 05 anos conforme o caso
- Gestantes: **3** (três) doses da vacina **dupla adulta** (toxóide tetânico e diftérico) com intervalo de 60 dias ou ,2 (duas) doses da vacina dupla adulto (dT) a depender do esquema vacinal anterior e 1(uma) dose da **vacina dTpa** (vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis acelular), a partir da 20ª semana de gestação. A vacina dTpa deve ser repetida a cada gestação independente da situação vacinal e/ou intervalo entre esquema vacinal.
- Profissionais de saúde: **3** doses da vacina contendo toxóide tetânico e diftérico com intervalo de 60 dias entre as doses a depender do esquema vacinal anterior. Administrar **1** (uma) dose da **vacina dTpa** (vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis acelular) para todos os profissionais de saúde e fazer o reforço, a cada **10** anos, com a **dTpa** em substituição da **dT**.